

Súgkjaftar (Insecta: Hemiptera) í Føroyum

Hemiptera in the Faroe Islands

Leivur Janus Hansen¹ og Jens-Kjeld Jensen²

¹ Tjóðsavnið, Kúrdalsvegur 15, FO-188 Hoyvík. Email: janush@savn.fo

² Í Geilini 37, FO-270 Nólsoy. Email: jkjensen@olivant.fo

Úrtak

Í hesi grein verða seks sløg av súgkjaftum: *Eurydema oleracea* (Linnaeus, 1758), *Eurydema ornata* (Linnaeus, 1758), *Nezara viridula* (Linnaeus, 1758), *Coreus marginatus* (Linnaeus, 1758), *Leptoglossus occidentalis* Heidemann, 1910 og *Phyllaphis fagi* (Linnaeus, 1761) lýst fyri fyrstu ferð í Føroyum. Eitt fullfíggað yvirlit er gjørt yvir hesi sløg og øll hini sløgini av Hemiptera, sum higartil eru skrásett í Føroyum. Harumframt eru føroysk nøvn sett á úrvald sløg og onnur flokkingarstig í hópinum Hemiptera.

Abstract

Six species of Hemiptera are recorded in the Faroe Islands for the first time: *Eurydema oleracea* (Linnaeus, 1758), *Eurydema ornata* (Linnaeus, 1758), *Nezara viridula* (Linnaeus, 1758), *Coreus marginatus* (Linnaeus, 1758), *Leptoglossus occidentalis* Heidemann, 1910 and *Phyllaphis fagi* (Linnaeus, 1761). A complete overview is given of all species of Hemiptera recorded from the Faroe Islands. In addition selected species and taxa are given Faroese names.

Inngangur

47 sløg av súgkjaftum (Hemiptera) eru áður skrásett í Føroyum (talva 1). Flest teirra hava fólk sum heild ikki serligan kunnleika um, men eyðvitað eru tey sløgini, ið hava einhvørja beinleiðis ávirkan á fólk, djór, hús ella vøkstur, mest kend millum fólk. Eins og føroyska navnið bendir á, hava djór í hesum hópi tað sereyðkenni, at tey hava kjaftlimir at súgva við.

Fenteka *Salda littoralis* (Linnaeus, 1758).
Her síggjast súgvandi kjaftlimirnir,
sum hópurin hevur fingið navnið eftir.
Mynd: Leivur Janus Hansen.



Skrásettt sløg

Elsta skráseting av súgkjafti í Føroyum er at finna í *Indberetninger fra en reise i Færøe 1781 og 1782* eftir J.C. Svabo (Svabo, 1959). Har stendur at lesa, at „Veggjalús *cimex aptera*, er sjelden, og rimeligen bragt til Landet i Meubler fra Kjøbenhavn.“ Síðan hevur Hansen (1881) 6 skrásetingar: Tvær froðusprettur: ríputeka (*Pithanus maerkelii*), fenteka (*Salda littoralis*) og bæði sløgin av bátsmanstekum, tjarnarteka (*Arctocoris carinata*) og hyljarteka (*Calli-corixa wollastoni*). Newstead (1904) skrásetur sekkjarskjaldlús (*Arctothezia cata-phracta*). Síðan verða 14 sløg lögð afturat í *Zoology of the Faroes* (Henriksen, 1929; Jørgensen, 1932). Heie (1972) leggur 6 sløg afturat, og Trolle & Ketil (1994a, 1994b) leggja 8 sløg afturat. Tolsgaard og Jensen (2010) skráseta 11 nýggj sløg, tó er iva-samt, um nakað av hesum sløgum hevur sjálvstøðugan bústovn í føroysku náttúr-uni. Í hesi grein verða 6 sløg lögð afturat. Hervið eru 53 sløg av súgkjaftum skrásettt í Føroyum.

Í hesi grein og í greinini hjá Tolsgaard og Jensen (2010) eru nýggju sløgin einstakar lívverur ið mugu metast sum innsløðingar. Í áðurnevndu eldri keldum sæst, at flestu sløgin eru savnaði úr sjálvstøðugum stovnum og ikki sum einstakar innsløddar lívverur. Heie (1972) metir, at av teimum 16 sløgnum, sum hann nevni, eru tað 10 ið eru knýtt at urtagarðsplantum.

Nøkur av skrásettu sløgnum eru inn-

slødd ella hava flogið higar uttan tó at festa búgv, men ógreitt er, hvussu nógv hesi eru (Tolsgaard & Jensen, 2010). Hetta samsvarar við eygleiðingar av fleiri sløgum í øðrum skordýrahópum, sum seinnu árin hava fest búgv í Føroyum og eru vorðin meira og minni vanlig. Summi sløg hava uttan iva ferðast higar á natúrligan hátt, og onnur eru komin higar við fólki ella farmi. Nevnast kunnu vanlig vespa (*Vespula vulgaris*) og týsk vespa (*Vespula germanica*) (Jensen & Bloch, 2001), fótgul bressa (*Eristalis pert-inax*) (Jensen, 2009) og húshumla (*Bombus lucorum*) og akurhumla (*Bombus pratorum*) (Jensen & Madsen, 2013).

Í teimum áðurnevndu og í øðrum útgávum eru sløgin stundum nevnd við øðrum frøðiheitum. Eitt nú er fenteka *Salda littoralis* (Linnaeus 1758) fyrstu ferð skrásettt av Hansen (1881), men tá er hon skrásettt við navninum *Salda litoralis*, og Henriksen (1929) skrásetti hana við navninum *Acanthia littoralis*. Í hesi grein eru samheiti, ið ikki verða nýtt longur, ikki tikin við.

Flokkning og vísindalig nøvn á sløgum og ættum eru grundað á GBIF (GBIF Secretariat, 2017), og undirhóparnir eru grundaðir á PESI (PESI, 2017). Sløgin eru skipað í stavrað og ikki eftir flokkingarskipan.

Nakrar nýggjar skrásetingar

Allar seks skrásetingar, sum eru tiknar við í hesi grein, eru av sløgum, sum ikki eru skrásettt áður. Tey eru øll skrásettt síðan útgávuna eftir Tolsgaard og Jensen í 2010.

Coreidae***Coreus marginatus* (Linnaeus, 1758)**

Nólsoy, 1 lívvera, 20.xii.2012, leg. Jacoba Thomsen.

***Leptoglossus occidentalis* Heidemann, 1910**

Streymoy, Tórshavn, 1 lívvera, 17.xii.2016, Pætur M. Dahl sambært mynd.

Streymoy, Tórshavn, innandura, 1 lívvera, 7.ix.2018, leg. Leivur Janus Hansen,
FOMNH-20422



Pentatomidae***Eurydema oleracea* (Linnaeus, 1758)**

Streymoy, Tórshavn, innandura, 1 lívvera, 10.i.2017, leg. Arnhold Olsen,
FOMNH-19891.



Eurydema oleracea (Linnaeus, 1758).
Mynd: Jens-Kjeld Jensen.

***Eurydema ornata* (Linnaeus, 1758)**

Streymoy, Tórshavn, innandura, 1 lívvera, 12.ix.2016, leg. Katrin Kallsberg.
Eysturoy, Strendur, innandura, 1 lívvera, 18.x.2016, leg. Helga Bára M. Vang,
FOMNH-19890.



Eurydema ornata (Linnaeus, 1758).
Mynd: Jens-Kjeld Jensen.

***Nezara viridula* (Linnaeus, 1758)**

Streymoy, Tórshavn, innandura, 1 lívvera,
12.xi.2012, leg. Kristina Eldevig.

Vágar, Vatnsoyrrar, í bingju úr Miðevropa,
2 lívverur, 19.x.2016, leg. Óli Lydersen,
FOMNH-19896, 19897.

Streymoy, Tórshavn, í bili úr Ungarn,
4 lívverur, 19 & 22.xi.2016, leg.
Dánial Jespersen og Páll Rói Poulsen,
FOMNH-19892, 19893, 19894, 19895.

Eysturoy, Toftir, innandura, 1 lívvera,
12.xi.2016, leg. Sóleyg Smidt.

Aphididae***Phyllaphis fagi* (Linnaeus, 1761)**

Streymoy, Tórshavn, í urtagarði, 1 lívvera,
12.vi.2012, Jógvan Hansen sambært
mynd.

Streymoy, Tórshavn, í urtagarði, 4 lívverur,
10.vi.2018, leg. Dánial Jespersen,
FOMNH-20181.

Leptoglossus occidentalis, ið er nevnd omanfyri, hevur síðan 1990-talið spreitt seg frá vestara parti av USA til stórar partar av heiminum, og henda teka er nú í øllum londum í Evropa (Endrestøl & Hveding, 2017). Hon spjaðist við fólki ella farmi, men er eisini sjálv før fyri at spjaða seg. Í Noregi er hendan tekan sett á svartalista (Gederaas *et al.*, 2012). Orsøkin er, at hon kann nørast á nálatrøum og gera skaða á trøini. Harumframt legst hon eisini inn í hús og kann gera skaða har (Endrestøl & Hveding, 2017). Hon kann eisini seta hol á PEX-vatnrør (Bates, 2005). Hetta slagið av rørum verður eisini nýtt í Føroyum.

Føroysk nøvn

Í hesi grein fær skordýrahópurin Hemiptera føroyskt navn, og føroyskt navn verður eisini sett á nøkur viðkomandi flokkingarstig (Jensen & Simonsen, 2004) í hópinum. Áður hevur føroyskt navn verið nýtt um onnur flokkingarstig í hópinum, og tey eru m.a. at finna í Føroysku orðabókini (Poulsen *et al.*, 1998), eitt nú teka (Homoptera), froðuspretta (Cicadidae) og blaðlús (Aphididae). Vit hava í mestan mun nýtt hesi nøvn, men hava tey ikki verið hóskandi, hava vit lagað tey til.

Nýggju nøvnini, sum vit hava ásett, lýsa útsjónd, lívshátt ella eyðkenni við slagnum ella leggja seg upp at norðurlenska ella enska frøðiheitinum. Tey flokkingarstig, ið her verða víst til, eru hópur (t.e. Hemiptera), fyra undirhópar, 17 ættir og 53 sløg.

Navnið á einum hægri flokkingarstigi (t.e. slekt og uppeftir) í sambandi við djóraflokk-ingarfrøði hevur altíð taksonomiska frøðinevnið sum eftirlíð. Sostatt hevur navnið á einum hópi altíð *-hópur* sum eftirlíð, og navnið á eini ætt hevur altíð *-ætt* sum eftirlíð o.s.fr. Tó verður frøðiheitið sera sjáldan nýtt í talu og skrift, tí vanligu verður fólksliga navnið nýtt og ikki navnið á flokkingarstiginum. Sum dømi kann nevast, at á gerandismáli nýta vit orðini firvaldar og svartaklukkur, men føroysku frøðiheitinu eru ávikavist firvaldahópur og svartaklukkætt.

Heldur enn at hava eina fasta reglu um, hvat flokkingarstig fær føroyskt navn, hava vit valt út tey flokkingarstig, sum vit meta hava tørv á einum føroyskum navni. Tað eru ikki øll sløginu, men einans tey, ið vit meta, at almenningurin kann kenna mun

á og kann hugsast at hava spurningar um ella viðmerkingar til. Vit hava sett navn á tey flokkingarstig, har vit meta, at almenn-ingurin ikki hevur tørv á ella førleika til, at gera mun á einstøkum sløgum, slektum ella ættum, undir hesum flokkingarstigi. Sostatt hevur undirhópurin Cicadomorpha fingið føroyskt navn, men ikki ættirnar ella sløgini í hesum undirhópi.

Talva 1: Undirhópar, ættir og sløg av súgkjaftum, ið eru skrásett í Føroyum, sett í stavrað. Føroyska frøðiheitið á lívverunum

er í høgra teigi. Keldan til fyrstu skráseting av einum slagi er merkt við tali: 1 Svabo (1959), 2 Hansen (1881), 3 Newstead (1904), 4 Jessen og Rasmussen (1922), 5 Henriksen (1929), 6 Jørgensen (1932), 7 Heie (1972), 8 Trolle og Ketil (1994a), 9 Trolle og Ketil (1994b) og 10 Tolsgaard og Jensen (2010). Tó eru nýggjar skrásetingar markaðar við *.

Tað eru nógv sløg, sum ikki eru meira enn 5 mm til støddar, og eisini kann roknast við, at einstøk av hesum sløgum eru staðbundin. Tískil er tað væntandi, at tað enn eru sløg, sum ikki eru skrásett.

Baraldsteka *Cyphostethus tristriatus* (Fabricius, 1787).
Mynd: Jens-Kjeld Jensen.



Yvirlit

Cicadomorpha	Froðusprettuundirhópur
Aphrophoridae	-
<i>Philaenus spumarius</i> (Linnaeus 1758) ⁵	-
Cicadellidae	-
<i>Anoscopus albifrons</i> (Linnaeus, 1758) ⁹	-
<i>Anoscopus flavostriata</i> Donovan, 1799 ²	-
<i>Arthaldeus pascuella</i> Fallén, 1826 ⁵	-
<i>Cicadula quadrinotata</i> (Fabricius, 1794) ⁵	-
<i>Macrosteles alpina</i> Zetterstedt, 1828 ⁹	-
<i>Macrosteles laevis</i> Ribaut, 1927 ⁵	-
<i>Macrosteles ossiannilssoni</i> Lindberg, 1954 ⁹	-
<i>Macrosteles viridigriseus</i> (Edwards, 1922) ⁹	-
<i>Ribautiana ulmi</i> (Linnaeus, 1758) ⁹	-
<i>Streptanus sordida</i> Zetterstedt, 1828 ²	-
Ulopidae	-
<i>Ulopa reticulata</i> Fabricius, 1794 ⁹	-
Fulgomorpha	Plantusprettuundirhópur
Delphacidae	-
<i>Javesella pellucida</i> (Fabricius, 1794) ⁹	-
Heteroptera	Tekuundirhópur
Acantosomatidae	Kjøltekuætt
<i>Acanthosoma haemorrhoidale</i> (Linnaeus, 1758) ¹⁰	-
<i>Cyphostethus tristriatus</i> (Fabricius, 1787) ¹⁰	Baraldsteka
<i>Elasmotethus interstinctus</i> (Linnaeus, 1758) ¹⁰	Leyvteka
Anthocoridae	Nevtekuætt
<i>Lyctocoris campestris</i> (Fabricius, 1794) ¹⁰	Reiðurteka
Cimicidae	Veggjatekuætt
<i>Cimex lectularius</i> Linnaeus, 1758 ¹	Lúsaveggjateka
Coreidae	Randartekuætt
<i>Coreus marginatus</i> (Linnaeus, 1758) *	-
<i>Leptoglossus occidentalis</i> Heidemann, 1910 *	Furuteka
Corixidae	Bátsmanstekuætt
<i>Arctocorisa carinata</i> (Sahlberg, 1819) ²	Tjarnarteka
<i>Callicorixa wollastoni</i> (Douglas & Scott, 1865) ²	Hyljarteka
Lygaeidae	Frætekuætt
<i>Kleidocerys resedae</i> (Panzer, 1797) ¹⁰	Birkiteka
<i>Spilostethus pandurus</i> (Scopoli, 1763) ¹⁰	Stásteka

Miridae	Grastekuætt
<i>Closterotomus norwegicus</i> (Gmelin, 1790) ¹⁰	Eplateka
<i>Lygus rugulipennis</i> Poppius, 1911 ¹⁰	Eingjarteka
<i>Pithanus maerkelii</i> (Herrich-Schaeffer, 1838) ²	Ríputeka
Pentatomidae	Stinktekuætt
<i>Dolycoris baccarum</i> (Linnaeus, 1758) ¹⁰	-
<i>Eurydema oleracea</i> (Linnaeus, 1758) *	-
<i>Eurydema ornata</i> (Linnaeus, 1758) *	-
<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758) *	-
<i>Palomena prasina</i> (Linnaeus, 1761) ¹⁰	-
Rhopalidae	Æðratekuætt
<i>Corizus hyoscyami</i> (Linnaeus, 1758) ¹⁰	-
Saldidae	Støkktekuætt
<i>Salda littoralis</i> (Linnaeus, 1758) ²	Fenteka
Sternorrhyncha	Plantulúsarundirhópur
Aphididae	Blaðlúsarætt
<i>Acyrtosiphon pisum</i> (Harris, M., 1776) ⁶	-
<i>Cavariella archangelicae</i> (Scopoli, 1763) ⁷	-
<i>Cryptomyzus galeopsidis</i> (Kaltenbach, 1843) ⁷	-
<i>Drepanosiphum platanoidis</i> (Schrank, 1801) ⁶	-
<i>Elatobium abietinum</i> (Walker, F., 1849) ⁶	-
<i>Eriosoma ulmi</i> (Linnaeus, 1758) ⁶	-
<i>Euceraphis punctipennis</i> (Zetterstedt, 1828) ⁷	-
<i>Hyperomyzus rhinanthi</i> (Schouteden, 1903) ⁷	-
<i>Jacksonia papillata</i> Theobald, 1923 ⁶	-
<i>Macrosiphum euphorbiae</i> (Thomas, C., 1878) ⁷	-
<i>Metopolophium dirhodum</i> (Walker, F., 1849) ⁶	-
<i>Myzaphis rosarum</i> (Kaltenbach, 1843) ⁷	-
<i>Nasonovia ribisnigri</i> (Mosley, 1841) ⁶	-
<i>Phyllaphis fagi</i> (Linnaeus, 1761) *	-
<i>Rhopalosiphum padi</i> (Linnaeus, 1758) ⁶	-
<i>Sitobion fragariae</i> (Walker, F., 1848) ⁶	-
<i>Thripsaphis verrucosa</i> Gillette, 1917 ⁶	-
Ortheziidae	Skjaldlúsarætt
<i>Arctorthezia cataphracta</i> Morrison, 1952 ³	Sekkjarskjaldlús
Psyllidae	Blaðloppuætt
<i>Cacopsylla pulchra</i> (Zetterstedt, 1840) ⁸	-

Tøkkir

Ole Fogh Nielsen og Søren Tolsgaard
fyri eyðmerking av nøkrum av nýggju
sløgunum.

Fólk kring landið, ið hava funnið og sent
høvundunum lívverur og myndir.

Marjun Arge Simonsen og Málráðið fyri
ráðgeving í sambandi við føroysku
nøvnini.

Heimildir

Bates, S.L. (2005). Damage to common
plumbing materials caused by
overwintering *Leptoglossus occidentalis*
(Hemiptera: Coreidae). *Canadian
Entomologist*, 137(4), 492-496.

Endrestøl, A., & Hveding, H. (2017).
Leptoglossus occidentalis (Het. Coreidae)
erobrer Europa. *Insekt-Nytt*, 42(3), 5-21.

GBIF Secretariat. (2017). GBIF Backbone
Taxonomy. Checklist Dataset [https://
doi.org/10.15468/39omei](https://doi.org/10.15468/39omei) (tikið niður
02/12-2017).

Gederaas, L., Moen, T.L., Skjelseth, S., &
Larsen, L.-K. (Eds.). (2012). *Fremmede
arter i Norge – med norsk svarteliste 2012*.
Trondheim.

Hansen, H.J. (1881). Faunula insectorum
Faeroeensis: Fortegnelse over de paa
Færøerne hidtil samlede insekter.
Naturhistorisk Tidsskrift, 3(13), 229-280.

Heie, O.E. (1972). Færøernes bladlus
(Homoptera, Aphidoidea). *Entomologiske
Meddelelser*, 40, 145-150.

Henriksen, K.L. (1929). Hemiptera (excl.
Aphidae). In R. Spärck & S.L. Tuxen

(Eds.), *The Zoology of the Faroes, Volume
II, Part II*. Copenhagen: Andr. Fred. Høst
& Søn.

Jensen, J.-K. (2009). Fund af nye og sjældne
svirrefluer på Færøerne (2000-2008).
Entomologiske Meddelelser, 77, 3-7.

Jensen, J.-K., & Bloch, D. (2001). Vespur.
Frøði, (1), 4-7.

Jensen, J.-K., & Madsen, H.B. (2013). To
arter af humlebier yngler på Færøerne
(Hymenoptera, Apidae). *Entomologiske
Meddelelser*, 81, 1-14.

Jensen, J.-K., & Simonsen, M.A. (2004).
Øktur føroyskur frøðinevnalisti.
Fróðskaparrit, 51, 212-213.

Jessen, K., & Rasmussen, R. (1922). En profil
gennem en Tørvemose paa Færøerne.
Danmarks Geologiske Undersøgelser IV,
1(13), 1-32.

Jørgensen, M. (1932). Aphidae. In R. Spärck
& S.L. Tuxen (Eds.), *The Zoology of the
Faroes, Volume II, Part II* (pp. 1-9).
Copenhagen: Andr. Fred. Høst & Søn.

Newstead, R. (1904). Coccidæ. *Proceedings
of the Royal Physical Society of Edinburgh*,
15, 156-157.

PESI. (2017). Pan-European Species
directories Infrastructure. [http://www.
eu-nomen.eu/portal/](http://www.eu-nomen.eu/portal/) (tikið niður 02/12-
2017).

Poulsen, J.H. W., Simonsen, M., Jacobsen, J.
í L., Johansen, A., & Hansen, Z.S. (1998).
Føroysk orðabók. Tórshavn: Føroya
Fróðskaparfelag.

Svabo, J.-C. (1959). *Indberetninger fra en
reise i Færøe 1781 og 1782*. Copenhagen:

Selskabet til Udgivelse af Færøske
Kildeskrifter og Studier.

Tolsgaard, S., & Jensen, J.-K. (2010). Nye
fund af tæger (Heteroptera) på Færøerne.

Entomologiske Meddelelser, 78(1), 21-28.

Trolle, L., & Ketil, P. (1994a). *Cacopsylla
pulchra* (Zetterstedt, 1838) - (Homoptera,
Phylloidea). - New to the Faroe Islands.

Fróðskaparrit, 41, 99-101.

Trolle, L., & Ketil, P. (1994b). The Leafhoppers
(Homoptera, Auchenorrhyncha) of the
Faroe Islands. *Fróðskaparrit*, 41, 107-124.